Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 4 aprile 2012

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - via salaria, 1027 - 00138 Roma - centralino 06-85081 - libreria dello stato Piazza G. Verdi. 1 - 00198 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI


Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

N. 67

MINISTERO DELLA SALUTE

Provvedimenti relativi a taluni prodotti fitosanitari.





SOMMARIO

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 ottobre 2011.		
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Naturkraft Lumachicida». (12A03475)	Pag.	1
DECRETO 17 gennaio 2012.		
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Turfene Plus». (12A03476)	Pag.	5
DECRETO 17 gennaio 2012.		
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Belem $0.8~MG$ ». (12A03477)	Pag.	9
DECRETO 23 gennaio 2012.		
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Altraz». (12A03478)	Pag.	12
DECRETO 23 gennaio 2012.		
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Maximan DG ». (12A03479)	Pag.	17
DECRETO 23 gennaio 2012.		
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Exemptor». (12A03480)	Pag.	21
DECRETO 23 gennaio 2012.		
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Flare Gold Combi Pepite». (12A03481)	Pag.	24



DECRETO 23 gennaio 2012.		
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Ouragan». (12A03482)	Pag.	27
DECRETO 27 gennaio 2012.		
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Scudex Duo». (12A03483)	Pag.	32
DECRETO 27 gennaio 2012.		
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Tucson WG ». (12A03484)	Pag.	35
DECRETO 27 gennaio 2012.		
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Persyng». (12A03485)	Pag.	39
DECRETO 14 marzo 2012.		
Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari dell'impresa Intrachem Bio Italia	ח	42
S.p.A. a base di piretrine - estratto B. (12A03486)	Pag.	42
DECRETO 14 marzo 2012.		
Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari dell'impresa Sepran s.a.s. a base di piretrine - estratto B. (12A03487)	Pag.	54

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Naturkraft Lumachicida».

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;
- **VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- **VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".
- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
- **VISTO** il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
- **VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";
- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- **VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie":
- **VISTI** i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- **VISTI** il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 2 settembre 2011 dall'impresa W. NEUDORFF Gmbh KG con sede legale in Emmerthal (Germania), An der Muhle 3, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato NATURKRAFT LUMACHICIDA, contenete la sostanza attiva fosfato ferrico, uguale al prodotto di riferimento denominato Ferramol Esca Lumachicida registrato al n. 12235 con D.D. in data 18 ottobre 2007, modificato successivamente con decreto in data 8 settembre 2011, dell'Impresa medesima;

RILEVATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Ferramol Esca Lumachicida registrato al n. 12235;

VISTO il decreto ministeriale del 9 agosto 2002 di recepimento della direttiva 2001/87/EC relativa all'iscrizione della sostanza attiva fosfato ferrico nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva fosfato ferrico nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza fosfato ferrico;

CONSIDERATO altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fosfato ferrico in Allegato I.

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa W. NEUDORFF Gmbh KG con sede legale in Emmerthal (Germania), An der Muhle 3, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato NATURKRAFT LUMACHICIDA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,250 - 0,400 - 0,500 - 0,800 - 1 - 2,5 - 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera: W. NEUDORFF Gmbh KG, D-21337 Luneburg (Germania).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15272.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 ottobre 2011

NATURKRAFT LUMACHICIDA

Esca lumachicida granulare a base di fosfato ferrico per piante floreali ed ornamentali coltivate in casa, balcone e giardino

COMPOSIZIONE

Fosfato ferrico g. 1 Coformulanti ed attrattivi q.b.a g. 100 Contenuto: 0,250-0,400-0,500-0,800-1-2,5-5 Kg

Partita n.

Vigo tille recorder steering

Stabilimento di produzione: W. Neudorff GmbH KG - D-21337 Lüneburg, Germania Distribuito da: ESCHER Srl - Via Miles, 2 - 20040 Cavenago Brianza (MI) - Tel. 02/95339216

Registrazione Ministero della Salute n.

W. Neudorff GmbH KG

An der Mühle 3 D-31860 Emmerthal (Germania) Tel. +49 051 55/624-0

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA

- Conservare nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici, lontano da alimenti, mangimi e bevande.
- Non mangiare n
 é bere n
 é fumare durante l'impiego del prodotto. Evitare l'inalazione, Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
- In caso di contaminazione accidentale è consigliabile, come primo intervento, lavare abbondantemente la parte contaminata.
- In caso di ingestione accidentale o di malessere conseguente all'esposizione consultare il medico mostrando l'etichetta del prodotto

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di altri animali. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE

NATURKRAFT LUMACHICIDA è un molluschicida pronto all'uso sotto forma di esca granulare a base di fosfato ferrico.

Combatte efficacemente lumache e limacce che causano gravi danni alle piante floreali ed ornamentali, sia in vaso che in terra, coltivate in casa, balcone, giardino.

L'esca ha un alto potere attrattivo verso tutte le lumache e le limacce e grazie a questa caratteristica i molluschi, richiamati dall'esca, lasciano i loro rifugi naturali. NATURKRAFT LUMACHICIDA presenta un nuovo meccanismo d'azione; entro breve tempo dall'assunzione dell'esca le lumache cessano di nutrirsi e quindi vi è un'immediata protezione delle piante, anche se dopo l'applicazione è possibile continuare a vedere ancora la presenza di individui.

Piogge, annaffiature o tempo umido, condizioni favorevoli per l'attività delle lumache e delle limacce, non hanno alcuna influenza sull'efficacia di NATURKRAFT LUMACHICIDA, in quanto il meccanismo d'azione del prodotto non comporta la disidratazione delle lumache. Inoltre il blocco dell'alimentazione non è accompagnato da emissione di bava, così non ci sono cattivi odori, né residui di bava intorno o sulle piante.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega come trattamento preventivo oppure alla prima comparsa delle lumache e delle limacce, intervenendo preferibilmente nelle prime ore serali quando i molluschi escono dai loro rifugi.

Piante floreali ed omamentali da casa, balcone e giardino:

Piante in vaso: 1,5 g per pianta.

Piante in terra (aiole e giardini): il prodotto si impiega distribuendolo tra le piante alla dose di 5 g/mq di terreno che possono essere ridotti a 2,5 mq in caso di basse infestazioni oppure distribuendolo lungo il perimetro dell'aiola/giardino su una banda di dimensione variabile a seconda della superficie dell'area, applicando 30 g di prodotto per 100 mq di superficie da proteggere. I trattamenti successivi devono essere eseguiti quando la presenza del prodotto sul terreno trattato inizia a scarseggiare.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto si impiega da solo.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON IMPIEGARSI IN AGRICOLTURA O SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. SE IL PRODOTTO È APPLICATO IN AMBIENTI CHIUSI, VENTILARE L'AMBIENTE DOPO L'APPLICAZIONE.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SYUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

12A03475




DECRETO 17 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Turfene Plus».

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;
- **VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".
- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
- **VISTO** il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
- VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";
- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- **VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";
- **VISTI** i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- **VISTI** il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
- VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- **VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
- VISTA la domanda presentata in data 14 novembre 2011 dall'impresa Diachem Spa sede legale in Albano S. Alessandro (BG), via Tonale 15, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato TURFENE PLUS, contenete le sostanze attive dicamba e mecoprop, uguale al prodotto di riferimento denominato Turfene L registrato al n.7368 con D.D. in data 8 gennaio 1988, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 27 gennaio 2010, dell'Impresa medesima;
- **CONSIDERATO** che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che
- -il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Turfene L registrato al n.7368;
- VISTO il decreto ministeriale del 26 novembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/70/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva mecoprop nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;



VISTO il decreto ministeriale del 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/69/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva dicamba nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive componenti;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva dicamba in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

CONSIDERATO altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 5 novembre 2008 entro il 31 dicembre 2011, pena la revoca dell' autorizzazione;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, l'Impresa Diachem Spa sede legale in Albano S. Alessandro (BG), via Tonale 15, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TURFENE PLUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 100 - 250; L 1 - 5 - 10 - 50.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Diachem Spa – U.P SIFA – Caravaggio (BG).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15291.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 gennaio 2012



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

SI'L EZELY

Diserbante selettivo per prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi, prati, pascoli. iquido solubile

OMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

g 20,14 (=217,5 g/l) DICAMBA Sale Dimetilamminico puro g. 1,54 (=16,6 g/l) MECOPROP Sale Potassico puro q.b. a

ITTOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE DIACHEM S.p.A.

Via Tonale, 15 - Albano S.Alessandro (BG) Fel. 035 581120



PERICOLOSO

IRRITANTE

PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non FRASI DI RISCHIO; Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli arganismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza. DFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.p.A.- U.P. SIFA, Caravaggio (BG)

gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non dispendere faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta,

del Registrazione Ministero della Salute n

QUANTITÀ NETTA DEL PREPARATO: litri 0,100 - 0,250 - 1 - 5 - 10 - 50

PARTITA N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Frattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenžia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per DICAMBA SALE DIMETHLAMMINICO 1,54% e MECOPROP 20,14% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: DICAMBA SALE DIMETILAMMINICO - Sintomi: MECOPROP Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia. Terapia sintomatica collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare, Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

II TURFENE PLUS è un erbicida selettivo studiato per la lotta contro le principali malerbe a foglia larga che infestano i tappeti erbosi di prati omamentali, campi da golf, campi sportivi, prati e pascoli.

trifoglio (Trifolium arvense), fumaria (Fumaria officinalis). stoppione (Cirsium arvense), vilucchio (Convolvolus II TURFENE PLUS risulta efficace nei confronti di numerose infestanti dicotiledoni annuali e poliennali fra le quali si annoverano: amaranto (Amaranthus retroflexus), fiordaliso (Centaurea cyanus) anagallide (Anagallis arvensis) papavero (Papaver rhoeas) cerastio (Cerastium arvense), borsa pastore (Capsella bursa pastoris), farinello (Chenopodium album), ranuncolo dei campi (Ranunculus arvensis), centocchio (Stellaria media) arvensis), Plantago spp, Equisetum spp., Rumex spp.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

Il diserbo con il TURFENE PLUS può essere eseguito in presenza di infestanti attive con temperature comprese tra 10 e 25°C, e a distanza di 5 ore da una pioggia.

La dose di impiego dovrà essere diluita in una quantità di acqua pari a 400-600 litri per ettaro, distribuendo il prodotto in modo uniforme sull'intera superficie trattata.. Si ricorda di procedere ad un accurato lavaggio delle attrezzature utilizzate dopo l'esecuzione del diserbo.

PRATI ORNAMENTALI, CAMPI DA GOLF, CAMPI SPORTIVI

al 1º anno di impianto: 5-6 litri per ettaro di superficie su prato affrancato

 dopo il 2º anno: 5-8 litri per ettaro di superficie durante tutto il periodo primaverile-estivo, intervenendo qualche giorno dopo il taglio.

7-8 litri per ettaro di superficie su infestanti poco sviluppate e qualche giorno dopo lo PRATI, PASCOLI: sfalcio. AVVERTENZA :in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si

verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

II TURFENE PLUS è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra quali ad esempio TMTD. COMPATIBILITÀ

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per gli impieghi non indicati in etichetta

INTERVALLO DI SICUREZZA: Prati, Pascoli: 20 Giorni

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO,

DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con DD del

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

TURFENE PLUS

Diserbante selettivo per prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi, prati, pascoli. Liquido solubile

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
DICAMBA Sale Dimetilamminico puro g 1,54 (=16,6 g/l)
MECOPROP Sale Potassico puro g 20,14 (=217.5 g/l)

a.b. a g 100





TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.p.A.

Via Tonale, 15 - Albano S.Alessandro (BG) Tel. 035 581120

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare Iontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente, Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.p.A.- U.P. SIFA, Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Salute n _____ del

PARTITA N.

QUANTITÀ NETTA DEL PREPARATO: ml 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con DD del

1 7 GEN. 2012

12A03476



DECRETO 17 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Belem 0,8 MG».

IL DIRETTORE GENERALE

- **VISTO** l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;
- **VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- **VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".
- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
- **VISTO** il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
- **VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";
- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- **VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";
- **VISTI** i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- **VISTI** il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
- VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
- VISTA la domanda del 25 febbraio 2010 presentata dall'Impresa SBM Dévelopment con sede legale in Marsiglia Cedex (Francia), 160 Route de la Valentine BP 90120, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato BELEM 0,8 MG contenente la sostanza attiva cipermetrina;

VISTE le convenzioni del 1 settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva cipermetrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 28 febbraio 2016 in attuazione della direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005;

VISTA la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa SBM Dévelopment a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 25 ottobre 2011 prot.33879 con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'iter di registrazione;

VISTA la nota pervenuta in data 10 novembre 2011 da cui risulta che l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

RITENUTO di autorizzare il prodotto BELEM 0,8 MG fino al 28 febbraio 2016 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cipermetrina;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

DECRETA

L'Impresa SBM Dévelopment con sede legale in Marsiglia Cedex (Francia), 160 Route de la Valentine – BP 90120, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BELEM 0,8 MG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 28 febbraio 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva cipermetrina nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 1-5-10-12-20-24-30.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera:

SBM Dévelopment, 160 Route de la Valentine – BP 90120, 13371 Marsiglia Cedex (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.14974.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2012



PERICOLOSO PER

L'AMBIENTE

Partita n.

BELEM 0.8 MG

Insetticida microgranulare per il controllo degli insetti del terreno

BELEM 0.8 MG Registrazione Ministero della Salute n. ... del ...

COMPOSIZIONE

CIPERMETRINA pura g. 0,8 Coformulanti q.b. a g. 100 Contenuto:

1-5-10-12-24-20-30 Kg

SBM Développement 160 Route de la Valentine - BP 90120

13371 Marsiglia Cedex 11 (Francia) Tel. +33 4 91 24 44 02/87

Distribuito da:

CERTIS ITALY - Viale J.M.E. de Balaguer, 6 - 21047 Saronno (VA) – Tel: 02 960 99 83 NUFARM ITALIA SRL - Via Luigi Majno, 17/A - Milano Sede operativa: Via Classicana 313, 48100 Ravenna - Tel 0544 60 12 01

Stabilimento di produzione: SBM FORMULATION - Beziérs (Francia)

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocarea lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da corpi idrici superficiali. Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici il prodotto deve essere interamente incorporato al terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato anche all'estremità dell'appezzamento. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Belem 0.8 MG è un insetticida microgranulare per il terreno a base di Cipermetrina che agisce per contatto e ingestione con effetto neurotossico su un gran numero di insetti terricoli ed in particolare sulle Nottue e gli Elateridi che attaccano le colture di mais, mais dolce, sorgo, girasole.

CAMPI D'IMPIEGO, EPOCHE E DOSI DI APPLICAZIONE

Belem 0.8 MG si applica al momento della semina tramite l'impiego di microgranulatori che localizzano i granuli lungo il solco di semina ed allo stesso tempo distribuiscono le sementi della coltura.

Al fine di assicurare un'ottima distribuzione dei microgranuli all'interno del solco di semina e il completo interramento del prodotto, Belem 0.8 MG deve essere applicato esclusivamente mediante un diffusore di plastica a forma di coda di carpa da fissarsi sulla seminatrice che viene fornito unitamente al prodotto. Belem 0.8 MG può essere applicato sia con i seminatori a righe, sia con quelli a disco.

Colture e dosi d'impiego

MAIS e MAIS DOLCE, SORGO e GIRASOLE: per il controllo di Elateridi (Agriotes sp), Nottue (Agrotis sp) e Diabrotica (Diabrotica virgifera), impiegare 12 Kg di prodotto per ettaro in trattamenti localizzati lungo il solco di semina.

COMPATIBILITÀ

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA


OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

1.7 GEN. 2012

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

12A03477



DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Altraz».

IL DIRETTORE GENERALE

- **VISTO** l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;
- **VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- **VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".
- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
- **VISTO** il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
- **VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";
- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- **VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";
- **VISTI** i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- **VISTI** il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
- VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- **VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
- VISTA la domanda presentata in data 12 dicembre 2011 dall'impresa Bayer CropScience S.r.l con sede legale in Milano, viale Certosa 130, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ALTRAZ, contenete la sostanza attiva bispyribacsodium, uguale al prodotto di riferimento denominato Nominee registrato al n.12070 con D.D. in data 16 gennaio 2004, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 14 novembre 2011, dell'Impresa medesima;

RILEVATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Nominee registrato al n.12070;

VISTA la direttiva 2011/22/UE, recepita con decreto ministeriale del 21 aprile 2011, relativa all'iscrizione della sostanza attiva bispyribac nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE, successivamente abrogata dal Reg. (UE) n. 740/2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009;

CONSIDERATO che la sostanza attiva bis , contenuta nel prodotto fitosanitario ALTRAZ è conforme alle condizioni stabilite dalla direttiva di iscrizione della sostanza attiva medesima;

CONSIDERATO altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 luglio 2021, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, l'impresa Bayer CropScience S.r.l con sede legale in Milano, viale Certosa 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ALTRAZ con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL: 75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 500;

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera: Kumiai Chemical Industry Co., Ltd., Tatsuno Factory, Tatsuno City, Japan, nonchè confezionato presso lo stabilimento dell'Impresa estera: Bayer CropScience Inc. – Canlubang – Calamba, Laguna – Filippine.


Il prodotto è confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese: Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG); IRCA Service S.p.A., Fornovo S. Giovanni (BG).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15329.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 gennaio 2012



ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

DISERBANTE SELETTIVO PER RISO

SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

ALTRAZ

COMPOSIZIONE

100 g di ALTRAZ contengono:

35,2 g di bispyribac sodium puro (408 g/l)

coformulanti quanto basta a 100.

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare Iontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.



IRRITANTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - 20156 Milano - Viale Certosa 130 - Tel. 02/3972.1

Officina di produzione e confezionamento: Kumiai Chemical Industry Co., Ltd., Tatsuno

Factory, Tatsuno City, Japan

Officine di confezionamento:

Bayer CropScience Inc. – Canlubang – Calamba, Laguna – Filippine; Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

IRCA Service S.p.A., Fornovo S. Giovanni (BG)

Distribuito da: BASF Italia S.r.I. - Via Marconato 8 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Registrazione Ministero della Salute N. del Contenuto netto: 75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 500 ml

Partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: non si sono rilevati sintomi clinici di intossicazione sull'uomo nè sugli animali di laboratorio. Terapia sintomatica.

Consultare un Centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Bispyribac-sodium è una sostanza attiva ad azione sistemica; il prodotto viene assorbito prevalentemente per via fogliare e rapidamente traslocato nelle parti in accrescimento delle piante infestanti dove esplica la sua azione.

EPOCA DI IMPIEGO: post-emergenza del riso, dall'emissione della terza foglia fino al pieno accestimento.

SPETTRO D'AZIONE:

Piante infestanti sensibili: giavoni (Echinochloa crus-galli, Echinochloa phyllopogon), cucchiaio (Alisma plantagoaquatica), eterantera (Heteranthera reniformis), vandellia delle risaie (Lindernia diffusa, Lindernia dubia), limnofila (Limnophila sessilifolia), erba miseria (Murdannia keisak).

Piante infestanti mediamente sensibili: quadrettone (Schoenoplectus mucronatus), cipollino (Bolboschoenus maritimus).

DOSE D'IMPIEGO

Riso: 60 - 75 ml/ha, in funzione dell'entità dell'infestazione presente, in miscela con 1 l/ha di Biopower[®].

VOLUME D'ACQUA: 300 - 600 litri/ha

Compatibilità: ALTRAZ è miscibile con altri prodotti antiparassitari. Si consiglia di verificare preventivamente la compatibilità del prodotto in miscela.

Il prodotto può indurre leggeri e transitori ingiallimenti della coltura; dopo pochi giorni tale sintomatologia non è più riscontrabile.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

— 14 -

Intervallo di sicurezza: non richiesto dato il tipo di impiego.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale 2.3 GEN. 2012

ALTRAZ®

DISERBANTE SELETTIVO PER RISO

SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

ALTRAZ

COMPOSIZIONE

100 g di ALTRAZ contengono:

35,2 g di bispyribac sodium puro (408 g/l)

coformulanti quanto basta a 100.

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.



IRRITANTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - 20156 Milano - Viale Certosa 130 - Tel. 02/3972.1

Registrazione del Ministero della Salute n.

Distribuito da: BASF Italia S.r.I. - Via Marconato 8 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Contenuto netto: 75 - 100 ml

Partita n°:

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore non può essere riutilizzato


Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.



marchio registrato

05.12.11

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del



Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Conservare al riparo dal gelo. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

® marchio registrato

05.12.11

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale 42. 3 GEN. 201;

12A03478



DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Maximan DG».

IL DIRETTORE GENERALE

- **VISTO** l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;
- **VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- **VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".
- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
- **VISTO** il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
- VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";
- **VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";
- **VISTI** i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- **VISTI** il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
- **VISTO** il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- **VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 29 novembre 2011 dall'impresa Cerexagri Italia Srl, con sede legale in S. Carlo di Cesena (FC), Via Terni, 275, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato MAXIMAN DG contenente le sostanze attive cimoxanil e mancozeb, uguale al prodotto di riferimento denominato Nautile DG registrato al n.10187 con D.D. in data 3 novembre 1999 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 1 luglio 2011, dell'Impresa medesima;

CONSIDERATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Nautile DG registrato al n.10187;

VISTO il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva mancozeb nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva cimoxanil nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanza attive componenti;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2012, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

CONSIDERATO altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 31 agosto 2009, entro il 28 febbraio 2012, pena la revoca dell' autorizzazione;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2012, l'Impresa Cerexagri Italia Srl, con sede legale in S. Carlo di Cesena (FC), Via Terni, 275, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MAXIMAN DG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g: 500; Kg 1-5-10-25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Cerexagri BV - Rotterdam (Olanda).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Sti Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

nonchè confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Torre S.r.l. - Torrenieri (SI);

Diachem S.p.A. – Caravaggio (BG);

Chemia S.p.A. – DOSSO (FE);

Scam S.r.l. - S. Maria di Mugnano (MO).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15322.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

MAXIMAN DG

FUNGICIDA AD AZIONE ANTIPERONOSPORICA IN GRANULI IDRODISPERDIBILI

COMPOSIZIONE MAXIMAN DG

		5	98	100
	o contengono:	Б	01	5
1	prodott	puro	buro	q.b. a
	100 grammi di	- CIMOXANIL	 MANCOZEB 	 Coformulanti

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Altamente tossico per gli organieffetti negativi per l'ambiente acquatico - Possibile rischio di danni ai bambini non ancora smi acquatici. Può provocare a lungo termine

nati



PERICOLOSO PER

L'AMBIENTE NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o

mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protetitivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Questo rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza suo contenitore devono essere smaltiti come materiale e

Titolare dell'autorizzazione CEREXAGRI ITALIA S.r.I.

Via Terni, 275 - S. Carlo di Cesena (FC) - tel. 0547.661523

Officine di produzione e confezionamento:
CEREXAGRI BV - Rotterdam (Olanda) - STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Cotignola (RA)
Officine di confezionamento: TORRE S.r.L. - Torrenieri (SI) - DIACHEM S.p.A. – Caravaggio (BG) CHEMIA S.p.A. – DOSSO (FE) - SCAM S.r.L. - S. Maria di Mugnano (MO)
Distribuito da: CHEMIA S.p.A. – Dosso (FE) - TERRANIALISI S.r.I. – Cento (FE) - SCAM S.r.I. – S.

Maria di Mugnano (MO) - EUROPHYTO T.S.A. s.r.l. – Fornovo San Giovanni (BG)

Registrazione del Ministero Salute N.

del Contenuto netto: g 500 - kg 1 -5 - 10 - 25

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare PARTITA

respiratorie (naso e bocca). Non impiegare in serra. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggersi le vie INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL nonché 5%, MANCOZEB 68%, le quall, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: CIMOXANIL (derivato dell'urea) - Sintomi: durante l'impiego può causare congluntivite, rinite, contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa Sono citati subittero ed ematuria MANCOZEB: Sintomi:

irritazione della gola e della cute. L'ingestione può provocare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea.

<u>Effetto antabuse:</u> si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, potensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino sensibilizzazione; SNC; atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. collasso ed alla perdita di coscienza. 7 Etichetta autorizzata con decreto

2012

della vite, del tabacco, del pomodoro, della patata e della rosa. MAXIMAN DG sfrutta le caratteristiche del SARATTERISTICHE: MAXIMAN DG è un fungicida in granuli idrodispersibili efficace contro la peronospora cymoxanil per inibire lo sviluppo del micelio anche all'interno dei tessuti vegetali colpiti grazie all'azione citotropica translaminare. La piena dose di mancozeb presente garantisce inoltre una adeguata protezione preventiva degli organi vegetali trattati.

MODALITÀ D'IMPIEGO: Versare MAXIMAN DG direttamente nella botte riempita per % con acque DOSI: Le dosi per ettolitro di acqua seguenti sono riferite all'utilizzo con attrezzature a volume normale mantenendo l'agitatore in funzione; aggiungere poi il rimanente quantitativo d'acqua previsto per l'impiego

salvo diversa indicazione VITE (da vino e da tavola)

Contro peronospora (Plasmopara viticola); 200-250 g/hl avendo cura di applicare comunque 2-2,5 kg/ha in caso di volumi di acqua inferiori a 10 hi per ettaro.

Per volumi superiori ai 10 hl/ha mantenere sempre la concentrazione in g/hl come sopra indicato MAXIMAN DG può essere applicato dalla fase di germogliamento a quella di pre-chiusura grappoio accordo con le seguenti modalità

- Applicazione secondo criterio preventivo
- Utilizzo del dosaggio più elevato in caso di forte pressione della malattia.
- Intervallo di trattamento: 7–8 giorni a seconda della pressione del patogeno, elevabile a 8 -- 10 giorni in caso di associazione con una componente sistemica.
- I trattamenti effettuati in corrispondenza del germogliamento sono efficaci anche nei confronti dell'Escoriosi

POMODORO e PATATA Control peronospora (Phytophtera infestans): 2-2,4 kg/ha impiegando volumi d'irrorazione di 600-1000 litri. In presenza di attacchi simultanei di peronospora ed alternaria utilizzare la dose massima.

MAXIMAN DG può essere applicato durante tutto il ciclo colturale per il controllo di peronospora secondo le seguenti modalità d'impiego:

- Applicare con criterio preventivo
- Utilizzare il dosaggio più elevato in caso di forte pressione della malattia
- Intervallo di trattamento: 7 9 giorni a seconda della pressione del patogeno.

Impiegare la dose più alta in situazione di forte attacco e su varietà particolarmente sensibili TABACCO
Contro peronospora (Peronospora (abacina): 200–250 g/hl.

ROSA Contro peronospora: 200-250 g/hl

Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnature) e ripeterli ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura. MAXIMAN DG è dotato di azione collaterale nei confronti di Ruggine e Ticchiolatura della rosa. COMPATIBILITÀ: NAUTILE" DG è fisicamente compatibile con tutti gli altri prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida ed inoltre con MICROTHIOL DISPERSS, OPTIX DG, POLTIGLIA DISPERSS, CUPROFIX F DISPERSS, CUPROFIX 30 DISPERSS. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere osservato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI TABACCO, UVA DA VINO ED UVA DA TAVOLA 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI POMODORO E PATATA. SOSPENDERE I TRATTAMENTI

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato -Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento - Il vendersi sfuso - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Ferapia: Sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

12A03479

20









DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Exemptor».

IL DIRETTORE GENERALE

- **VISTO** l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;
- **VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".
- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
- VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
- **VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";
- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- **VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";
- **VISTI** i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
- VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- **VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
- VISTA la domanda del 22 marzo 2010 presentata dall'Impresa Bayer Cropscience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato EXEMPTOR contenente la sostanza attiva thiacloprid;
- VISTE le convenzioni del 1 settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli Studi di Pisa Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;



VISTO il decreto del 17 febbraio 2005 di inclusione della sostanza attiva thiacloprid, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2014 in attuazione della direttiva 2004/99/CE della Commissione del 1 ottobre 2004;

VISTA la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Bayer Cropscience Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 25 marzo 2011 prot. 9015 con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'iter di registrazione;

VISTA la nota pervenuta in data 21 dicembre 2011 da cui risulta che l' Impresa Bayer Cropscience Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

RITENUTO di autorizzare il prodotto EXEMPTOR fino al 31 dicembre 2014 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva thiacloprid;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

DECRETA

L'Impresa Bayer Cropscience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato EXEMPTOR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2014, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva thiacloprid nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,5-1-5-10-15-20-25-50.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimento delle Imprese:

S.T.I. Solfotecnica Italiana - Cotignola (RA);

SipcamS.p.A. - Salerano sul Lambro (LO).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Bayer SAS – Marle sur Serre (Francia)

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.14983.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2012



EXEMPTOR®

INSETTICIDA SISTÉMICO GRANULARE PER PIANTE ORNAMENTALI E DA FIORE

COMPOSIZIONE

g 100 di EXEMPTOR® contengono :

g 10 di THIACLOPRID puro (100 g/kg) coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO:

Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1

Officine di produzione e confezionamento:

Bayer SAS – Marle sur Serre (Francia) S.T.I. Solfotecnica Italiana - Cotignola (RA) SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)

Registrazione Ministero della Salute n. de Contenuto netto: 0,5-1-5-10-15-20-25-50 kg



NOCIVO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n.

Prescrizioni supplementari

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI e MODALITA' DI IMPIEGO

Exemptor è adatto per la difesa professionale delle piante ornamentali e da fiore, coltivate in vaso o in altri contenitori, in vivaio e in serra

Exemptor deve essere incorporato e miscelato nel substrato di coltivazione prima della semina, trapianto o rinvaso ad opera di un utilizzatore professionale.

FLOREALI e ORNAMENTALI

- contro afidi (Macrosiphoniella sanbomi, Macrosiphum euphorbiae, Aphis gossypii, Myzus persicae) una applicazione alla dose di 200 fino a 300 g per metro cubo di substrato di coltivazione.
- contro oziorrinco (Otiorhynchus spp.), lepidotteri (Cacyreus marshalli), aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci), una applicazione alla dose di 400 g per metro cubo di substrato di coltivazione.

Allo scopo di migliorare l'efficacia di Exemptor si consiglia di inumidire con una leggera annaffiatura il substrato di coltivazione dopo il trattamento per facilitare il rilascio del principio attivo dai granuli e aumentare la velocità di assorbimento da parte delle radici delle piante.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dall'umidità.


(Bayer CropScience

[®] Marchio registrato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.

2 3 GEN. 2012

12A03480



DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Flare Gold Combi Pepite».

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;
- **VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".
- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
- **VISTO** il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
- VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";
- **VISTI** i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
- VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
- VISTA la domanda presentata in data 2 dicembre 2011 dall'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato FLARE GOLD COMBI PEPITE, contenete le sostanze attive metalaxyl M e folpet, uguale al prodotto di riferimento denominato Ridomil Gold Combi Pepite registrato al n.12878 con D.D. in data 3 gennaio 2006, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 11 marzo 2010, dell'Impresa medesima;

RILEVATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Ridomil Gold Combi Pepite registrato al n.12878;

VISTO il decreto ministeriale del 29 luglio 2003 di recepimento della direttiva 2002/64/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva metalaxyl M nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva metalaxyl M nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

VISTO il decreto ministeriale del 26 aprile 2007 di recepimento della direttiva 2007/5/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva folpet nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

CONSIDERATO altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 settembre 2012, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2012, l'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FLARE GOLD COMBI PEPITE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 1 - 2-4-5-10.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: S.T.I. solfo tecnica Italiana S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA);

Torre S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino – SI).

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento delle Imprese estere:

Syngenta Agro S.A., Gaillon (Francia)

Kwizda Agro GmbH, Leobendorf (Austria)

IPT-Pergande Gesellschaft für industrielle Entstaubungstechnik GmbH, Weissandt-Gölzau (Germania)

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15317.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 gennaio 2012



rattasi di associazione delle seguenti sostanze attive INFORMAZIONI PER IL MEDICO Flare GOLD® COMBI PEPITE

le qualt, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione Fungicida specifico per la lotta contro la peronospora Granuli idrodisperdibili

della vite Composizione

100 g di prodotto contengono:

9 9 100

coformulanti q.b. a metalaxil-m puro

folpet puro

Nocivo per inalazione sensibilizzazione per Possibilità di effetti cancerogeni-prove RASI DI RISCHIO Può provocare insufficienti

contatto con la pelle

Caratteristiche

provocare a lungo termine Altamente tossico per gli organismi acquatici, può effetti negativi per

PERICOLOSO PER

L'AMBIENTE

Dosi e modalità d'impiego

ambiente acquatico

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da CONSIGLI DI PRUDENZA

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con Conservare fuori della portata dei bambini le dovute precauzioni

Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni immediatamente il medico (se possibile, mostrargli speciali/schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale e/o il suo contenitore devono In caso di incidente o di malessere consultare Usare indumenti protettivi e guanti adatti essere smaltiti come rifiuti pericolosi

del Syngenta Crop Protection S.p.A. Via Gallarate 139, Milano - Tel. 02-33444.1 SYNGENTA AGRO S.A., Gaillon (Francia) Registrazione Ministero della Salute n. Partita n vedi corpo della confezione Stabilimento di produzione:

TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino Entstaubungstechnik GmbH, Weissandt-Golzau (Germania) S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2. Cotignola (RA) IPT-PERGANDE Gesellschaft für industrielle Kwizda Agro GmbH. Leobendorf (Austria) itri stabilimenti di produzione:

Altre taglie: kg 2-4-5-10

"Avvertenze"

metalaxil-m

sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida Qualora si verificasse una non efficacia del trattamento a causa della selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, syngenta di copertura

nonché tuta standard, guanti e maschera durante l'applicazione del prodotto. Per gli addetti al rientro è necessario l'uso di Utilizzare tuta standard e guanti durante la miscelazione, Non impiegare il prodotto su vivai di vite guanti protettivi.

opacità

possibile

COU

ed oculare

METALAXIL-M. irritante cutaneo

omeale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea.

comune impiego fatta eccezione per la Poltiglia bordolese, polisolfun ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con Il prodotto è miscibile con gli insetticidi e gli anticrittogamici di più olii minerali e polisolfuri Compatibilità interessamento del SNC con irritabilità o depressione, possibili anemia e FOLPET irriante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia, irritazione gastro intestinale brucion gastroesofagei, ancressia, vomito, diarrea); interessamento aritmia):

Cianosi

(ipotensione,

cardiocircolatorio

dell'apparato

FOLPET

nefropatia (ematuria, proteinuna, urobilinogeno nelle urine).

Consultare un Centro Antiveleni.

Terapia: sintomatica.

NOCIVO

osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere della miscelazione compiuta

Fitotossicità

FLARE GOLD COMBI PEPITE è un fungicida ad azione preventiva e

curativa indicato per la lotta contro la Peronospora della vite

Il primo trattamento verrà eseguito dopo il verificarsi della prima pioggia infettante per i trattamenti successivi l'attività sistemica del prodotto permetterà anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa

nell'intervallo che intercorre tra un trattamento e l'altro

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in

"Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva tossica per le api, nociva per gli uccelli."

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta

Attenzione: da implegarsi esclusivamente in agricoltura.

Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

Intervenire al verificarsi di condizioni sufficienti a

g/100 litri di acqua minima 2 kg/ha) esop)

Plasmopara

VITE

viticola

per uve da vino

applicazione

Modalità di

Patogeno

Coltura

promuovere l'infezione

giorni, in funzione della pressione della malattia primaria. Proseguire i trattamenti ogni 10-14

per un massimo di 4

applicazioni

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua DA NON VENDERSI SFUSO Non operare contro vento

Da non applicare con mezzi aerei

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso

Il contenitore non può essere riutilizzato

E opportuno inoltre, specie in condizioni particolarmente favorevoli al patogeno, ridurre ulteriormente l'intervallo tra l'utimo trattamento con FLARE GOLD COMBI PEPITE ed il prodotto successivo, proseguendo

la difesa con fungicidi a differente meccanismo di azione (strobilurine

rameici,

Per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo d'acqua

sufficiente ad assicurare la buona copertura della vegetazione.

impiego del FLARE GOLD COMBI PEPITE è particolarmente indicato

nelle zone e condizioni in cui il rame può dare luogo a fitotossicità o

comunque a fenomeni secondari negativi a carico della vite. L'uso regolare del FLARE GOLD COMBI PEPITE per i trattamenti alla

vite consente di prevenire e contenere in misura apprezzabile gli

attacchi di Botrytis cinerea.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

GEN. 2012 23 Ø

12A03481

26









DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Ouragan».

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;
- **VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
- **VISTO** il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
- VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";
- **VISTI** i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
- VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
- VISTA la domanda presentata in data 2 dicembre 2011 dall'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato OURAGAN, contenete la sostanza attiva glifosate, uguale al prodotto di riferimento denominato Touchdown registrato al n.17919 con D.D. in data 16 maggio 1990, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 16 settembre 2011, dell'Impresa medesima;
- **CONSIDERATO** altresì che il prodotto di riferimento è stato ri-registrato in conformità all'Allegato III del decreto legislativo 194/95 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI sulla base del fascicolo A12798QA;

RILEVATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Touchdown registrato al n.17919;

VISTO il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

VISTO il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza glifosate;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate in Allegato I del decreto legislativo 194/95;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in con sede legale in Milano, Via Gallarate 139 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato OURAGAN con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 100 - 250 - 500; L 1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 50 - 200.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: Althaller Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI), nonché confezionato presso lo stabilimento dell'Impresa: IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG).


Il prodotto è imporato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: Syngenta Chemicals B.V. – Seneffe (Belgio).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15318.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 gennaio 2012



syngenta

OURAGAN®

Erbicida sistemico non selettivo

concentrato solubile

100 g di prodotto contengono coformulanti q.b. a glifosate acido puro

27,9 (360 g/l) 100 0 0

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da Conservare fuori della portata dei bambini. bevande

Non mangiare, né bere, né fumare durante

Avvertenza: impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti

Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: vito, olivo, melo, pero, arancio, cedro, clementino, mandarino, limone, pompelmo.

Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della colpisce il tronco anche ben lignificato: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino, actinidia, nocciolo. Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva

prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina iso, soia, prati, vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali): non prima di 48 ore dal trattamento.

Aree non destinate alla coltivazione: aree rurali e industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI D'IMPIEGO
Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata.
del tipo di attrezzatura impiegata.
1-2 l/100 litri d'acqua sulle annuali/biennali e di 2-5 l/100 litri d'acqua sulle perenni

DOSI SUGGERITE PER IL CONTROLLO DELLE PRINCIPALI INFESTANTI ANNUALI E BIENNALI 1,5-4 ll/ha: CANNUALI E BIENNALI C. 5-4 ll/ha: Control (Aloredum murinum), Loglio (Lollum spp.), Mercorella (Mercurialis spp.), Fienarola (Poa spp.), Riso crodo (Orza sativa), Visnaga maggiore (Ammi majus), Amaranto (Amaranthus spp.), Fiorancio (Qaiendula spp.), Fairnello (Chenopodium spp.), Fiorancio (Qaiendula spp.), Fairnello (Chenopodium spp.), Orobanche (Orobanche spp.), Erba porcellana (Portulaca spp.), Ravanello selvatico (Raphanus spp.), Senecione (Senecio spp.), Senepe selvatica (Sinapis spp.), Centocchio (Stellaria spp.), Veronica (Veronica spp.),

PERENNI

5-7 Ilha: Cucchiaio (Alisma spp.), Asfodelo (Asphodelus spp.), Giunco fiorito (Butomus spp.), Cipero (Cyperus spp.), Ferula (Ferula spp.), Giunco (Juncus spp.), Nardo (Nardus spp.), Cipollino (Spriganium spp.), Farfaraccio (Tussilago spp.). 4-5 Uha: Agropiro (Agropyron repens), Carice (Carex spp.), Stoppione (Cirsium spp.), Euforbia (Euphorbia spp.), Fienarola d'acqua (Glyceria app.), Iperico (Hypericum spp.), Asperella decras (Glyceria spp.), Romice (Hymex spp.), Grespino (Gonchus spp.), Sorghetta (Sorghum halepense).

Acetosella 8 Ilha: Agrostide (Agrostis spp.), Aglio (Allium spp.), Artemisia (Artemisia spp.), Panace conune (Heracleum spp.), Acetosella (Oxalis spp.), Cannuccia di palude (Phragmites spp.), Felce (Pendium spp.), Ranuncolo (Ranunculus spp.), Mazza sorda (Typha spp.), Ortica (Urtica spp.).

ARBUSTI

4-6 Uha: Acero (Acer spp.), Frassino (Fraxinus spp.), Ginestra (Genista spp.), Salice (Salix spp.), Sambuco (Sambucus spp.), Falso mirtillo (Vaccinium spp.).

Per l'olivo destinato alla produzione di olive da ollo la dose massima autorizzata è 6 l/ha ed è necessario sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

In tutte le applicazioni effettuare un solo trattamento all'anno

FITOTOSSICITA'

Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici NORME PRECAUZIONALI

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti Conservare la confezione ben chiusa accuratamente con acqua e sabone

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi Consultare un Centro Antiveleni di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, biennali o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici OURAGAN è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle

ed agli organi perennanti.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare o in alternativa
estetto di 5 m da vegetascione naturale da tutelare o in alternativa
utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%. OURAGAN non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

MODALITA' D'IMPIEGO

Attrezzature, volumi d'acqua e miscele OURAGAN consente di ottenere migliori risultati con ugelli a specchio ca ventaglio utilizzando volumi d'acqua non superiori a scocchio Olina. L'addizione alla miscela di 10 kg/ha di solfato ammonico può risultare utile.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A. Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1

L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse, come siccità freddo, attacchi parassitari ha efficacia ridotta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal tratamento. Non impegare attrezzature e recipienti galvanizzati es zincato) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili. pogee della pianta.

del

Syngenta Chemicals B.V. - Seneffe (Belgio) Registrazione Ministero della Salute n.

Stabilimento di produzione:

CAMPI D'IMPIEGO

ALTHALLER Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)

Altro stabilimento di produzione:

Partita n. vedi corpo della confezione

loro emergenza: asparago

200

Altre taglie: ml 100; ml 250; ml 500; 15; 110; 120; 125;

RCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)

Stabilimento di confezionamento:

Terreni agrari in assenza della coltura (ortaggi, fragola, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais,

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

('impiego

syngenta

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti

da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e

per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento.


Da non vendersi sfuso.

— 30

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del



syngenta

OURAGAN®

Erbicida sistemico non selettivo

COMPOSIZIONE

concentrato solubile

100 g di prodotto contengono. glifosate acido puro coformulanti q.b. a

27.9 (360 g/l) 100 00

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del $/2\,3\,$ GEN, $\,2012\,$

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente Il contenitore non può essere riutilizzato

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da Conservare fuori della portata dei bambini. pevande

Non mangiare, né bere, né fumare durante

l'impiego

— 31

Via Gallarate, 139 - MILANO - Tel. 02-33444.1 SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.

Stabilimento di produzione: Syngenta Chemicals B.V. – Seneffe (Belgio)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. vedi corpo della confezione

Altro stabilimento di produzione: ALTHALLER Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)

Stabilimento di confezionamento: IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)

marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

12A03482



DECRETO 27 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Scudex Duo».

IL DIRETTORE GENERALE

- **VISTO** l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;
- **VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- **VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".
- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
- **VISTO** il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
- **VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";
- **VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";
- **VISTI** i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
- VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
- VISTA la domanda presentata in data 3 agosto 2010 dall'impresa Makhteshim Agan Italia srl, con sede legale in Bergamo, via Falcone 13, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SCUDEX DUO contenente le sostanze attive tebuconazolo e zolfo, uguale al prodotto di riferimento denominato Dedalus Combi G, registrato al n. 12947 con D.D. in data 26 febbraio 2009, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 27 giugno 2011, dell'Impresa medesima;

RILEVATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Dedalus Combi G registrato al n. 12947;

VISTO il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/EC relativa all'iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze componenti;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 6 febbraio 2013, data di scadenza attribuita al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

CONSIDERATO altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale dell' 11 dicembre 2009 entro il 30 giugno 2012, pena la revoca dell' autorizzazione;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 6 febbraio 2013, l'Impresa Makhteshim Agan Italia srl, con sede legale in Bergamo, via Falcone 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SCUDEX DUO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0.2 - 0.5 - 1 - 5 - 10.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa:

L.I.F.A. Srl – Maniago (PN)

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

Sulphur Mills Limited – Gujarat – India.

Il prodotto suddetto è registrato al n.15042.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 gennaio 2012

Il direttore generale: Borrello



SCUDEX DUO

FUNGICIDA PER LA VITE E I CEREALI Tipo di formulazione: polvere bagnabile

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

-Tebuconazolo puro -Zolfo puro (selenio assente) -Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle - Nocivo per gli organismi acquatici, Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti, In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta, Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Sri

Via G.Falcone 13 - 24126 Bergamo Tel 035 328811

Officina di produzione: SULPHUR MILLS LIMITED - Gujarat - India / L.I.F.A. S.r.l. - Maniago (PN)

Autorizzazione del Ministero della Salute nº Distribuito da: Gowan Italia S.p.a. - Faenza (RA)

Contenuto netto: Kg 0,2-0,5-1-5-10 Partita Nr. vedi timbro

Prescrizioni Supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive (s.a.): Tebuconazolo 4.5%, Zolfo 70%, Tali s.a., separatamente, provocano i sintomi di intossicazione riportati come segue. Tebuconazolo: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossica-zione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. METABOLISMO: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Zolfo: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. TERAPIA: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

SCUDEX DUO è un fungicida sistemico ad azione preventiva, curativa ed eradicante in polvere bagnabile. Viene rapidamente assorbito dagli organi vegetativi e viene traslocato attraverso lo xilema in direzione acropeta, sfuggendo così al dilavamento e proteggendo la vegetazione che si sviluppa dopo il trattamento. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale (1000-1200 l/ha). Nel caso di trattamenti a volume ridotto adeguare la concentrazione in modo da mantenere costante la dose per ettaro.

contro Oidio (Uncinula necator)

Intervenire alla dose di 0,22% (220 g per 100 litri di acqua, pari a 2,2-2,6 kg/ha, in funzione del volume d'acqua) ogni 10-14 giorni in funzione della sensibilità varietale, dell'andamento climatico e della pressione infettiva. Come per tutti i triazoli, esiste anche per il tebuconazolo il rischio di sviluppare ceppi resistenti. Tale rischio è ridotto con questo prodotto fitosanitario, che contiene anche zolfo, sostanza attiva a differente meccanismo d'azione. È comunque opportuno usare il prodotto in alternanza con altri formulati a diverso meccanismo d'azione.

CEREALI (FRUMENTO E ORZO)

- Intervenire alla dose di 5 kg/ha posizionando il trattamento come di seguito:
 contro le malattie del piede (Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobulus graminis) in fase di accestimento-levata.
- contro oidio (Erisyphe graminis), ruggini (Puccinia spp.), Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis, in fase di inizio levata-spigatura.
- contro fusariosi della spiga (Fusarium spp.) in fase di piena fioritura.
 contro septoria (Septoria spp.) in fase di inizio levata-spigatura.

COMPATIBILITA': Il prodotto è incompatibile con i prodotti alcalini.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazio-

INTERVALLO DI SICUREZZA: 14 giorni prima del raccolto. Per frumento e orzo sospendere i trattamenti a fine fioritura.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

> 2 7 GEN. 201 "Etichetta Autorizzata con Decreto Dirio

12A03483



DECRETO 27 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Tucson WG».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

- VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;
- **VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".
- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
- **VISTO** il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
- VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";
- **VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";
- **VISTI** i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
- VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
- VISTA la domanda presentata in data 5 ottobre 2011 dall'impresa Rotam Agrochemical Europe Limited con sede legale in Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6QR United Kihgdom, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Tucson contenente la sostanza attiva nicosulfuron, successivamente ri-denominato TUCSON WG, uguale al prodotto di riferimento denominato Sahel 75 WG registrato al n. 12550 con D.D. in data 29 settembre 2008 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 15 dicembre 2010, dell'Impresa medesima;

CONSIDERATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Sahel 75 WG;

RILEVATO pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

VISTO il decreto ministeriale del 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Nicosulfuron nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto ministeriale del 30 giugno 2009 di recepimento della direttiva 2009/51/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva nicosulfuron;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 dicembre 2018, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

CONSIDERATO altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 29 aprile 2008, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, l'Impresa Rotam Agrochemical Europe Limited con sede legale in Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6QR – United Kihgdom, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TUCSON WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0.05 - 0.08 - 0.100 - 0.200 - 0.400.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

Jiangsu Rotam Chemistry Co. Ltd – n. 88 Rotam Rd ETDZ, Kunshan, Jiangsu Province 215301 China. Il prodotto suddetto è registrato al n. 15284.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 gennaio 2012

Il direttore generale: Borrello



Bozza 09/11-ver.01

TUCSON WG

Diserbante di post-emergenza selettivo per il mais in microgranuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- Nicosulfuron puro g 75 - Coformulanti g .b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Rotam Agrochemical Europe Limited

Camrascan House, Minerva Business Park, Lynch Wood Peterborough, Cambridgeshire PE2 6QR – England Tel. +33 427027333

Officina di Produzione: Rotam Agrochemical Europe Limited – Kunshan, Jiangsu (China)

Distribuito da:

Autorizzazione del Ministero della Salute n. ... del...

Kg 0,050 - 0,080 - 0,100 - 0,200 - 0,400

Partita n.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusi. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: in caso di intossicazione ricorrere al medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia: sintomatica. Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE: TUCSON WG è un diserbante di post-emergenza selettivo per il controllo delle principali infestanti graminacee e a foglia larga del mais. Viene rapidamente assorbito dalle foglie e, limitatamente, dalle radici delle piante trattate, è traslocato, mediante i flussi linfatici, agli apici vegetativi. Il prodotto blocca la crescita delle malerbe subito dopo la penetrazione all'interno degli organi vegetali, riducendo così la competizione con la coltura; successivamente si evidenziano i sintomi visibili, quali ingiallimenti e necrosi dei tessuti, cui si accompagna la morte delle infestanti.

TUCSON WG è particolarmente efficace nei confronti di graminacee quali Avena (Avena spp.), Agropiro (Agropyron repens), Coda di volpe (Alopecurus myosuroides), Giavone (Echinocloa crus-gallis), Loglio (Lolium spp.), Setaria (Setaria spp.) Sorghetta da seme e da rizoma (Sorghum halepense) e di numerose malerbe a foglia larga quali Amaranto (Amaranthus spp.), Ambrosia (A. artemisifolia), Carota selvatica (Ammi majus), Forbicina (Bidens tripartita), Borsa del pastore (Capsella bursa pastoris), Ruchetta selvatica (Diplotaxis spp.), Fumaria (Furmaria officinalis), Camomilla (Matricaria camomilla), Galinsoga parviflora), Erba Mercurella (Mercurialis annua), Lattaiola (Picris echioides), Persicaria (Polygonum persicaria), Persicaria maggiore (Polygonum lapathifolium), Erba porcellana (Portulaca oleracea), Rafano (Raphanus raphanistrum), Rapistro (Rapistrum rugosum), Senape selvatica (Sinapis arvensis), Grespino (Sonchus oleraceus), Centocchio (Stellaria media). Meno sensibili all'azione del diserbante risultano alcune malerbe quali Panico (Panicum spp.), Sanguinella (Digitaria sanguinalis), Stramonio (Datura stramonium), Topinambur (Helianthus tuberosus), Fitolacca (Phitolacca americana), Cipero (Cyperus spp.), Convolvolo nero (Fallopia convolvolus), Erba morella (Solanum nigrum), Nappola o Spino d'asino (Xanthium spp.).

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

TUCSON WG si impiega da quando la coltura ha raggiunto la stadio delle 2-3 foglie fino alle 5-6 foglie. I risultati migliori si ottengono quando le infestanti dicotiledoni hanno 2-4 foglie e le graminacee hanno uno sviluppo compreso fra le 2 foglie e l'inizio dell'accestimento. La Sorghetta da rizoma risulta particolarmente sensibile al diserbante fra i 10 e 20 cm di altezza.

În caso di infestanti sensibili, TUCSON WG va applicato alla dose di 53 g/ha. Nel caso di infestazioni comprendenti malerbe mediamente o scarsamente sensibili è consigliabile utilizzare TUCSON WG in miscela con formulati a base di Dicamba, Fluroxipir, Sulcotrione, Mesotrione, ecc.

TUCSON WG va applicato su colture di mais in buono stato vegetativo e su infestanti in fase di attiva crescita. Evitare di trattare con temperature inferiori ai 10°C e superiori ai 25°C od in presenza di stress idrici. Utilizzare volumi di acqua compresi fra 200 e 400 l/ha, impiegando pompe a media o bassa pressione e ugelli a ventaglio. L'aggiunta di un bagnante adesivo non ionico o di olio (minerale o vegetale) aumenta l'efficacia del trattamento erbicida. L'assorbimento del diserbante da parte delle infestanti è da ritenersi ottimale quando siano trascorse almeno 4 ore fra il trattamento ed eventuali piogge PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

TUCSON WG, dopo essere stato dosato, deve essere versato direttamente nella botte riempita per circa un quarto o nel serbatoio di pre-miscelazione dell'irroratore. Mantenendo l'agitatore in funzione, portare a volume il serbatoio; effettuare quindi il trattamento mantenendo costantemente la poltiglia in agitazione, anche durante eventuali soste con irroratore chiuso.

— 37 -

Bozza 09/11-ver.01

AVVERTENZE

- Non impiegare TUCSON WG su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride.
- I geoinsetticidi a base di Teflutrin, Benfuracarb, Carbosulfan, Carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specie nel trattamento unico che potrebbero dare origine a fenomeni di fitotossicità.
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
- a) Svuotato il serbatoio, risciacquarlo accuratamente con acqua pulita unitamente alla pompa e alla barra di distribuzione; svuotare quindi nuovamente l'impianto di distribuzione.
- b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione al 5% di ipoclorito di sodio nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barra di distribuzione mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
- c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto precedentemente.
- d) Eliminare accuratamente le tracce di ipoclorito di sodio risciacquando completamente serbatoio, pompa e barra con acqua pulita.
- e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di ipoclorito di sodio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003).

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

12A03484



DECRETO 27 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Persyng».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

- VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;
- **VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".
- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
- VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
- VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";
- **VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";
- **VISTI** i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
- **VISTO** il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
- VISTA la domanda presentata in data 27 maggio 2010 dall'impresa Makhteshim Agan Italia srl, con sede legale in Bergamo, via Falcone 13, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato PERSYNG contenente la sostanza attiva Tebuconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato Icarus EW registrato al n. 12574 con D.D. in data 6 febbraio 2008, modificato successivamente con decreto in data 19 gennaio 2010, dell'Impresa Makhteshim Chemical Works LTD con sede legale in P.O.B. 60- Beer Sheeva Israele;

RILEVATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Icarus EW registrato al n. 12574;

VISTO il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza tebuconazolo;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 6 febbraio 2013, data di scadenza attribuita al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

CONSIDERATO altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 31 agosto 2009 entro il 28 febbraio 2012, pena la revoca dell' autorizzazione;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 6 febbraio 2013, l'Impresa Makhteshim Agan Italia srl, con sede legale in Bergamo, via Falcone 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PERSYNG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da m L 10 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500; L 1 - 5 - 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: Makhteshim Chemical Works LTD, Beer Sheva – Israele.

Il prodotto suddetto è registrato al n.15021.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 gennaio 2012

Il direttore generale: Borrello



12A03485

(EMULSIONE OLIO/ACQUA)
FUNGICIDA SISTEMICO PER POMACEE (MELO, PERO).
DRUPACEE (PESCO e NETTARINO, CILIGGIO, ALBICOCCO.
SUSINO EUROPEO), VITE, ORTICOLE (CETRIOLO, 2UCCHINO,
POMODORO, PEPERONE, MELONE, COCOMERO, CARCIOFO
ASPARAGO), CEREALI (FRUMENTO, ORZO, SEGALE e AVENA)

le B PERSYNG Autorizzazione del Ministero della Salute n.

Tebuconazolo puro 19,6 g (= 200 g/l) coformulanti q.b. a 100 g Composizione

Tossico per gli può provocare a danni ai bambini non ancora nati. Nocivo:
può causare danni ai poimoni in caso
d'ingestione. L'esposizione ripetuta può
provocare secchezza e screpolature della
pelle. L'inalazione dei vapori può organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di RISCHIO: 5 FRASI

mangiare, në bere, në fumare durante l'Impiego. Non respirare i vaponi. Evitare il contatto con la pelle e con gii occhi. Non gettare i residu nelle fognature. Indossare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso provocare sonnolenza e vertigini. CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non imangiare, né bere, né fumera l'impiego, Non respirare i vapori. Evitare il consultare medico (se possibile, nostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifluti disperdere nell'ambiente malessere nformative in materia di sicurezza. ō mmediatamente 0 alle d'incidente pericolosi.

MAKHTESHIM AGAN ITALIA SH

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. - Beer-Sheva (Israele) Via Falcone 13 - 24126 Bergamo - Tel. 035 328811 Stabilimento di produzione:

Contenuto ml 10-50-100-200-250-500 L 1-5-10 Partita n. vedi timbro

Distribuito da: Syngenta Crop Protection SpA - Milano

indumenti. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi ā

o il suo contentiore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Prescrizioni Supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto

COCOMERO, CARCIOFO: contro Oldio 60 ml/hi di acqua. Intervenire con trattamenti preventivi ogni 10-12 giomi al manifestarsi delle

fegato, reni Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semblici demattil eritematose a demattil necrotizzanti). Provoca tosse, semblici demattil eritematose a demattil necrotizzanti). Provoca tosse, sistemica di spinea bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica.

Sintomi - Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In

solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo:

dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.

condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della maiatita.

ASPARAGO: contro Oidio, Ruggini e Stemfiliosi 60 mi/ni di acqua.
Intervenire durante la stagione vegetativa, esclusivamente dopo la raccolta dei turioni, al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo

500-1000 l/ha.

possibile

a segni del

naturalmente

oltre

cefalea

diarrea) e

 conto oidio (Erysiphe graminis), ruggini (Puccinia spp.), Pyrenophora Ophiobolus graminis) in fase di accestimento-levata;

contro fusariosi della spiga (Fusarium spp.) in fase di piena floritura; contro septoria (Septoria spp.) in fase di inizio levata-spigatura. alcalini che potrebbero ridurre la sua attività. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

FITOTOSSICITÀ: su melo, in particolari condizioni climatiche,

Contro ticchiolatura (Venturia inaequalis, Venturia pirina): 50 ml/hl di trattamenti preventivi ogni 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 10-15 giorni oppure curativamente entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione.

acqua in miscela con fungicidi di copertura. Intervenire con

volumi d'acqua di 1400-1500 l/ha su melo e 1400-1600 l/ha su pero. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale. POMACEE (melo e pero): effettuare max 4 trattamenti utilizzando

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

avena).

NOCIVO

pomodoro, peperone, 7 giorni prima dei raccolto per pesco e nettarino, cillegio, albicocco e susino, melone, cocomero, carciofo; Sospendere i trattamenti 3 giorni prima per cetriolo, zucchino, 14 glorni per vite; 15 giorni per pero; 30 giorni per melo, frumento

Contro alternaria del melo e maculatura bruna del pero (Stemphylium

Contro mal bianco del melo (Podosphaera leucotricha): 50 ml/hl di

ATTENZIONE: da implegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi implega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle pertetta in condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (Art. 9, comma 3, D.L.vo n° 65/03) OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

contro ruggine del susino (*Tranzschelia pruni-spinosae*) 1 o 2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi della malattia

contro mal bianco (Sphaerotheca pannosa): 60-90 ml/hl di acqua;

dose di 50-75 ml/hl di acqua;

alla dose di 60 mVhl di acqua. VITE: effettuare max 4 trattamenti utilizzando volumi d'acqua di 1000

Contro oldio (Uncinula necator): intervenire alla dose di 50 ml/hi acqua ogni 10-14 giorni in miscela o in alternanza con prodotti

diverso meccanismo d'azione

1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 giorni tra di loro alla

1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 60-90 ml/hl di

contro Monilia spp. e Botrytis cinerea

nettarino e susino.

europeo): effettuare max 2 trattamenti utilizzando volumi d'acqua di 1200-1500 l/ha su albicocco e ciliegio e 1000-1500 l/ha su pesco,

DRUPACEE (albicocco, cillegio, pesco e nettarino, susino

vesicarium): 60-90 ml/hl di acqua.

PERICOLOSO PER

L'AMBIENTE

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SYLIOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RUTILIZZATO
EVITARE CHE LE DONNE IN ETA' FERTILE SIANO ESPOSTE AL PRODOTTO. a G

2 7 GEN 2012 "Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del.

CEREALI (frumento e orzo): effettuare 1 trattamento alla dose di 1,25 L/ha (in 300-600 litri di acqua/ha) posizionando il trattamento come di Su orticole effettuare max 4 trattamenti utilizzando volumi d'acqua di sviluppo della malattia.

 contro le malattie del piede (Pseudocercosponella herpotrichoides seguito

teres, Rhynchosponium secalis, in fase di inizio levata-spigatura;

PERSYNG è un fungicida sistemico per impieghi preventivi e curativi su

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE Terapia: sintomatica.

pomacee (melo e pero), drupacee (pesco, nettarino, cillegio, abbocco, susino), viue, orticolie (estrolo, cucchino, pomodor, peperone, melone, cocumero, carciotó, asparago), cereali (frumento, orzo, segale ed

COMPATIBILITÀ: PERSYNG non deve essere miscelato con preparati

il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si della intossicazione, miscelazione compiuta. casi verificassero

prodotto può causare rugginosità.







DECRETO 14 marzo 2012.

Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari dell'impresa Intrachem Bio Italia S.p.A. a base di piretrine - estratto B.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE del 18 dicembre 2008 della Commissione relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva piretrine componente il prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto;

VISTA in particolare la nuova purezza minima della sostanza attiva in questione, fissata per l'estratto B in 480 g/kg di piretrine, indicata nell'allegato al sopra citato decreto 22 aprile 2009;

CONSIDERATO che l'impresa Intrachem Bio Italia S.p.A., titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del citato decreto 22 aprile 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti provvedendo nel contempo all'adeguamento dei prodotti stessi ai nuovi requisiti sopraindicati;

VISTO il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva componente in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato DL.vo 194/95 nei tempi e con le modalità definite dalla direttiva di iscrizione stessa;

CONSIDERATO che, di conseguenza, la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto può essere concessa fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva piretrine fatta salva la presentazione ai sensi dell'art 3, comma 2 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del citato decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n 545/2011 della Commissione, nei tempi e secondo le modalità fissate dalla direttiva di iscrizione in allegato I della sostanza attiva componente e la conseguente valutazione da parte della Commissione alla luce dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del medesimo decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n 546/2011 della Commissione;

VISTA la nota con la quale l'impresa Intrachem Bio Italia S.p.A. titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, ha trasmesso le etichette adeguate al sopra citato decreto 22 aprile 2009 ottemperando a quanto richiesto dall'ufficio circa le indicazioni della sostanza attiva piretrine nelle etichette stesse, comunicando nel contempo la modifica di denominazione dell'officina di produzione Kollant Srl-Vigonovo (VE) già LIFA Srl.;

RITENUTO pertanto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto fino al 31 agosto 2019 fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'articolo 3, commi 2 e 3 del citato decreto 22 aprile 2009, pena la revoca dell'autorizzazione;

VISTI i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

DECRETA

Sono ri-registrati provvisoriamente fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva piretrine i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa Intrachem Bio Italia S.p.A. alle nuove condizioni fissate dal decreto 22 aprile 2009.

Sono altresì autorizzate le modifiche indicate nell'ultima colonna della tabella in allegato al presente decreto.

Sono fatti salvi:

gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'articolo 3, commi 2 e 3, del citato decreto 22 aprile 2009 di iscrizione della sostanza attiva piretrine, che fissa tempi e modalità di presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n 545/2011 della Commissione, ai fini della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n 546/2011 della Commissione.

Sono approvate quale parte integrante del decreto le etichette allegate con le quali i prodotti fitosanitari devono essere posti in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il direttore generale: Borrello



ALLEGATO

Prodotti fitosanitari dell'impresa Intrachem Bio Italia S.p.A. a base della sostanza attiva **piretrine** - **estratto B** ri-registrati provvisoriamente fino al 31 agosto 2019 ai sensi del decreto ministeriale 22 aprile 2009 .di recepimento della direttiva 2008/127/CE del 18 dicembre 2008 della Commissione.

N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Modifiche autorizzate
012948	EVERGREEN EC	23/08/2006	Modifica della composizione in adeguamento a quanto stabilito dal DM 22/04/2009 relativamente alla purezza della sostanza attiva piretrine (480 g/Kg); Modifica della denominazione dello stabilimento di produzione Kollant Srl-Vigonovo (VE) già LIFA Srl.
012566	PYGANIC 1.4	15/03/2005	Modifica della composizione in adeguamento a quanto stabilito dal DM 22/04/2009 relativamente alla purezza della sostanza attiva piretrine (480 g/Kg); Modifica della denominazione dello stabilimento di produzione Kollant Srl-Vigonovo (VE) già LIFA Srl.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

EVERGREEN®

Insetticida liquido concentrato emulsionabile a base di Piretro naturale

100 g di prodotto contengono:

g 60,00 q.b. a g 100 Coformulanti e Solvente Piperonil Butossido (purezza 480 g/kg) Piretrine pure

60,00 (= g 600 /lt)

provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e verifaini. FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici,



CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). In caso d'ingestione consultare alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. gettare i residui nelle fognature. Usare incidente o di malessere consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. PERICOLOSO PER L'AMBIENTE Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di IRRITANTE

Via XXV Aprile, 44 -- 24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035 - 335313 Intrachem Bio Italia S.p.A.

Officine di produzione e confezionamento

H.C.A. Service S.p.A. - Strada Statale Cremasca 591 n. 10, Fornovo S. Giovanni (BC) MGK - 4001 Peavey Road Chaska - MN 55318 USA Kotlant S.c.L. - Via C. Colombo, 7/7a - Vigonovo (VE) Althaller Italia S.r.I. S. Colombano al Lambro (Mi)



Contenuto netto: cc 50 - 100 - 250 - 500; lt 1 - 5

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

NORME PRECAUZIONALI

Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonche iperstimolando pre-post sinapticamente nervosa trasmissione Sintomi: bloccano la dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aereer rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia,

Ferapia: sintomatica e di rianimazione - Consultare un Centro Antiveleni sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

CARATTERISTICHE

EVERGREEN® EC è un insetticida a base di solo Piretro naturale in supporto liquido di origine vegetale e può essere impiegato su moltissime colture agrarie in qualsiasi stagione. EVERGREEN® EC è un insetticida di contatto che agisce rapidamente contro i parassiti delle vegetazione, come lfantria americana e Galerucella luteola o succhiatori come Corythucha ciliata. EVERGREEN® EC e compatibile con fartilizzanti fogliari. Non è miscelabile con la Tripidi, Tentredini, Criocera dell'asparago, Moscerino del pomodoro, Dorifora della patata e della melanzana, nonché contro gli insetti defogliatori della quali Afidi, Aleurodidi (Mosca Bianca), Metcalfa, Psille, poltiglia bordolese, polisolfuri ed altri prodotti alcalini. orticole, frutticole e floricole, Cavolaia, Coccinialie, Tianole,

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO FRUTTICOLE

Drupacee (susine, ciliegie, albicocche, pesche, prugne, nettarine) contro Afidi, Mosca della frutta, Cocciniglie, Tignole, Tentredini, Tripidi: ml 50-60/hl d'acqua; Metcalfa: 60 ml/hl d'acqua;

Pomacee (mele, pere, cotogne) contro Afidi (all'inizio dell'infestazione) compreso Afide Cocciniglie, Ricamatori, Cimice, Piralide: ml 50-60/hl d'acqua; contro Metcalfa: 60 ml/hl grigio del melo (in prefioritura), Tripidi, Antonomo, Psilla (prima della melata), Tentredini Minatori (adulti) compreso Minatore delle foglie del melo, Tingide del pero, Mosca della frutta d'acqua;

frutta, Cocciniglia, Tignole, Formica argentina, Aleurodidi (adulti): ml 50-60/hl d'acqua; contre Agrumi (pompelmi, limoni, mandarini, arance) contro Afidi, Tripidi, Cimici, Mosca della Metcalfa: 60 mil/hl d'acqua;

Olivo contro Mosca dell'olivo, Tignoia, Cocciniglie, Tripidi: mi 50-60/hi d'acqua; curhie Metcalfa: 60 ml/hl d'acqua;

Frutta a guscio (Mandorle e Nocciole) contro Pentatomidi (cimici verdi), Afrdi (all'imzio Tingide del mandorlo: ml 50-60/hl d'acqua; contro Metcalfa: 60 ml/hl dell'infestazione),

Vite contro Tignola dell'uva e della vite, Tripidi, Cocciniglie, Cicaline, Scafoideo della vite: ml Melograno contro Afidi, Cocciniglie, Tignole: ml 50-60/hl d'acqua; Metcalfa: 60 ml/hl d'acqua; 50-60/hl d'acqua; contro Metcalfa: 60 ml/hl d'acqua;

Etichetta autorizzata con decreto dingenziale del









Fico contro Cicaline, Psilla, Cocciniglie, Tignole: ml 50-60/hl d'acqua; contro Metcalfa: 60

ORTAGGI (esclusi i funghi)

Bietola da costa e da orto, Cavolo, Spinacio, Finocchio, Sedano, Radicchio, Cicoria, Indivia, Prezzemolo, Rapa, Ravanello, Asparago contro Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Altica, Cimici, Cicaline, Criocera, Dorifora, Piralide, Tipula, Tentredini, Mosca, Cavolaia, Tignole: ml 50-60/hl d'acqua; Carciofo, Pisello, Fagiolo, Fagiolino, Lattuga, Fava, Cipolla, Carota,

Cavolo contro Cavolaia: ml 50-60/hl d'acqua;

Pomodoro contro Moscerino bianco (adulti): ml 50-60/hl d'acqua.

Asparago contro Criocera: ml 50-60/hl d'acqua

Aglio, Porro, Scologno contro Tripidi, Mosca: ml 50-60/hl d'acqua; Melanzana, Peperone contro Dorifora,: ml 50-60 ml /hl d'acqua,

Cucurbitacee (zucca, zucchino, melone, cocomero, cetriolo) contro Afidi, Tripidi: ml 50-

FRAGOLA contro Afidi, Tripidi, Cimici, Psille: ml 50-60/hl d'acqua

PATATA contro Dorifora: ml 50-60 ml /hl d'acqua

TABACCO contro Aleurodidi (Mosca Bianca), Afidi, Bemisia: ml 50-60/hl d'acqua

CEREALI contro Afidi, Cimice: ml 50-60/hl d'acqua.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO contro Afidi: ml 50-60/hl d'acqua

GIRASOLE contro Afidi: ml 50-60/hl d'acqua

FORAGGERE LEGUMINOSE contro Afidi, Filonomo, Cicaline: ml 50-60/hl d'acqua.

FLORICOLE IN PIENO CAMPO

Crisantemo, Garofano, Rosa contro Afidi, Aleurodidi, Tentredini, Tripidi, Minatori fogliari Metcalfa, Cicaline: ml 50-60/hl d'acqua

Metcalfa, Formiche, Tingidi (Corythucha ciliata), Coleotteri e Lepidotteri defogliatori; ml 50-FLOREALI E ORNAMENTALI contro Cicaline, Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Cocciniglie, 60/hil d'acqua (nel caso di larve di Ifantria al di sopra di 2 cm: ml 60/hi d'acqua) DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZINATE (Frutta fresca, Pomodoro fresco, Cereali in granella, Leguminose in granella) contro Mosche, Moscerino, Cimici, Tignote; ml 50-60/hl

HORIZIN BUT IN

சுந்தாதாக்கு e forestali site in aree verdi quali parchi, viali e giardini pubblici contro Afidi இந்த witestapone), Tingidi, Aleurodidi (adulti), Altica, Antonomi, Pentalomidi, Cocciniglie, ศีรี Cicaline Cormiche, Mcligete, Mosche, Tripidi, Tentredini ml 50-60/hl d'acqua; Metcalfa. hismicetazione delle sementi contro Struggigrano, Calandre: mi 50-60/hi d'acqua

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata. Utilizzare volumi d'acqua e pressioni adeguate per ottenere una buona copertura della coltura. Curare in modo particolare la pagina inferiore delle foglie nel caso di Aleurodidi (mosca bianca), Tripidi e Tingidi (Corythucha ciliata)

Attenzione: durante la fase di miscelazione e caricamento del prodotto utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie e occhiali protettivi.

Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di

più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza

INTERVALLO DI SICUREZZA: DUE GIORNI

ATTENZIONE

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

Non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

Operare in assenza di vento Da non vendersi sfuso

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente Il contenitore non può essere riutilizzato.

7.07 -1

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

- ETICHETTA RIDOTTA -

EVERGREEN® EC

Insetticida liquido concentrato emulsionabile a base di Piretro naturale

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

Piretrine pure

6.00

(purezza 480 g/kg) Piperonil Butossido

Coformulanti e Solvente

60,00 (= g 600 /lt)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.





IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la peile. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Intrachem Bio Italia S.p.A.

Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035 - 335313

Officine di produzione e confezionamento

MGK - 4001 Peavey Road Chaska - MN 55318 USA Althaller Italia S.r.i. - S. Colombano al Lambro (MI)

IRCA Service S.p.A. - Strada Statale Cremasca 591 n. 10, Fornovo S. Giovanni (BG) Kollant S.r.I. - Via C. Colombo, 7/7a - Vigonovo (VE)

Registrazione n. 12948 del 23.08.2006 del Ministero della Salute

Contenuto netto: cc 50 - 100

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle

NORME PRECAUZIONALI

Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione - Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITOPE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE -IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

– 47 -

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziala dat 14 MAR. 2012



PYGANIC 1.4

INSETTICIDA LIQUIDO CONCENTRATO EMULSIONABILE A BASE DI PIRETRO NATURALE

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono

(purezza 480 g/kg) Piretrine pure

g 1,4 (= 12,91 g/l)

g 100

Coformulanti e Solventi q.b. a



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di contatto con la pelle, lavare chiuso. Conservare Iontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. In caso Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare il recipiente ben durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle, In caso di contatto con gli occhi, di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli la etichetta). nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle azionde agricole e dalle strade

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.

via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassophio (Bergamo) - Tel. 035 - 335313

Distribuito da. Zapi Industrie Chimiche S.p.A. - Z.I. Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD)

Rev. 0212

OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO

MGK - 4001 Peavey Road Chaska - MN 55318 USA Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)

IRCA Service S.p.A. - S.S Cremasca 591 n. 10 - Fornovo S. Giovanni (BG) Kollant S.r.l. - Via C. Colombo, 7/7a - Vigonovo (VE)

Zapi Industrie Chimiche S.p.A. - Z.I. Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD)

Registrazione n. 12566 del 15.03.2005 del Ministero della Salute

Contenuto: 1 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 cc; 1 - 5 litri

kiferimento Partita n.

INFORMAZIONI MEDICHE

bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni Sintomi a carico del sistema nervoso centrale: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie neree: neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini

rinorrea, tosse, broncospasmo e dispuea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia

Terapia: sintomatica e di rianimazione - Consultare un Centro Antiveleni sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

PYGANIC 1.4 è un insetticida a base di Piretro naturale in supporto liquido di origine vegetale che può Fignole, Cavolaia, Tripidi, Tentredini, Criocera dell'asparago, Moscerino del pomodoro, Dorifora della fruticole e floricole, quali per esempio Afidi, Aleurodidi (Mosca Bianca). Metcalfa, Psille, Cocciniglie, PYGANIC 1.4 è un insetticida di contatto che agisce rapidamente contro i parassiti delle orticole patata e della melanzana, nonché contro gli insetti defogliatori della vegetazione e succhiatori essere impiegato su un numero elevato di colture agrarie in qualsiasi stagione dell'anno.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Pomacee (mele, pere, cotogne) contro Afidi (all'inizio dell'infestazione) compreso Afide grigio del Drupacee (susine, ciliegie, albicocche, pesche, prugne, nettarine) contro Afidi. Mosca mediterranca melo (in prefioritura), Tripidi, Antonomo, Psilla (prima della melata), Tentredini, Minatori (adulti) compreso Minatore delle foglie del melo, Tingide del pero, Mosca mediterranea della frutta. Ricamatori della frutta, Tignole, Tentredini. Tripidi: ml 150-250/hl d'acqua; Metcalfa: 250 ml/hl d'acqua:

Cimice, Piralide: ml 150-250/hl d'acqua;

B

contro Metcalfa: 250 ml/hl d'acqua;

Agrumi (pompelni, limoni, mandarini, arance) contro Afidi, Tripidi, Cinici, Mesca mediterranca della frutta. Tignole, Formica argentina. Alcurodidi (adulti): ml 150-250/hl d'acqua; contro Metcalfa; 250 ml/hl d'acqua;

Olivo contro Mosca dell'olivo, Tignola, Cocciniglie, Tripidi; ml 150-250/hl d'acqua; contro Metcallac

Frutta a guscio (Mandorle e Nocciole) contro Pentatomidi (cimici verdi). Alfdi (ail'imizio dell'infestazione). Tingide del mandorlo: ml 150-250/hl d'acque: contro Metcalfa: 250 ml/hl d'acqua: 250 ml/hi d'acqua;

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del



Vite contro Tignola dell'uva e della vite, Tripidi, Cicaline. Scafòideo della vite: ml 150-250/hl d'acqua; contro Metcalfa: 250 ml/hl d'acqua;

inoltre essere osservato le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si

verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

Il prodotto è tossico per i pesci, le api e gli insetti utili

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 2 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Deveno

Melograno contro Affdi, Cocciniglie, Tignole: ml 150-250/hl d'acqua; Metcalfa: 250 ml/hl d'acqua; Froc contro Cicaline, Psilla. Cocciniglie. Tignole: ml 150-250/hl d'acqua: contro Metcalfa: 250 ml/hl

Carciofo, Pisello, Fagiolo, Fagiolino, Lattuga, Fava, Cipolla, Carota, Bietola da costa e da orto, Cavolo, Spinacio, Finocchio, Sedano, Radicchio, Cicoria, Indivia, Prezzemolo, Rapa, Rayanello, Asparago contro Afidi. Aleurodidi, Tripidi, Altica. Cimici, Cicaline, Criocera, Dorifora, Piralide, Lipula, Tentredini. Mosca, Cavolaia, Tignole: ml 150-250/hl d'acqua,

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali,

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta

Pomodoro contro Moscerino bianco (adulti); mi 250/hl d'acqua; Cavolo contro Cavolaia: ml 150-250/hl a acqua;

Melanzana, Peperone, Patata, contro Docifora: ml 150-250 ml /hl d'acqua; Tabacco contro Aleurodidi (Mosca Bianca), Afidi: ml 150-250/hl d'acqua;

Aglio, Porro, Scalogno contro tripidi, mosca: ml 150-250/hl d'acqua:

Cucurbitacee (zucca, zucchino, melone, cocomero, cetriolo) contro Afidi, Tripidi: ml 150-250/fil

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non puo essere riutilizzato

Per evilare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso.

FRAGOLA contro Afidi. Tripidi, Chrici, Psille: ml 150-250/hl d'acqua.

CEREALI contro Afidi, Cimice: ml 150-250/hl d'acqua

BIETOLA DA ZUCCHERO contro Afidi: ml 150-250/hl d'acqua.

FORAGCERE LEGUMINOSE contro Fitonomo, Cicaline: ml 150-250/hl d'acqua.

FLORICOLE IN PIENO CAMPO

Crisantemo, Garofano, Rosa contro Afidi. Alcurodidi; Tentredini, Tripidi, Minatori logliari, Metealfa Cicaline: ml 150-250/hl d'aequa.

Formiche, Tingidi, Coleotteri e Lepidotteri defogliatori: ml 150-250/hl d'acqua (nel caso di farve di FLOREALJ E ORNAMENTALI contro Cicaline, Afidi. Aleurodidi, Tripidi, Psille, Dantria al di sopra di 2 cm: mi 250/hi d'acqual.

sufficienti ad assicurare una completa ed miforme bagnatura della Vegetazione, alla prima comparsa dei parassiti, possibilinente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata. Utilizzare volume d'acqua e pressioni adeguate per otrenere ura buena coperaria della collera. Curace in medo particolare trattamenti vanna effettuati con qualsiasi apparecebio a medio-basso volume con quantità di acqua ta pagina indainto delle loglie nel casa di Manavilai tanesca bianca). Tripidi e Tingidi. AVVERTENZA: PVetekNIC 14 e compathite con jerifizzani fupikat. Non e msęclabile son la politigia koriolesa, polisoliur ed altri pradoni aleafini. Per ogni evennale miscela <u>con altri fo</u>rmânt. è consigliabile of lethers lest prefiminari di compatibilità Elichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 1 L MAR. 2012

Rev. 624.3







- FOGLIO ILLUSTRATIVO -

PYGANIC 1.4

INSETTICIDA LIQUIDO CONCENTRATO EMULSIONABILE A BASE DI PIRETRO NATURALE

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono;

Piretrine pure

(purezza 480 g/kg)

g 1,4 (= 12,91 g/l)

Coformulanti e Solventi q.b. a

001 g



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. In caso durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi. lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come riffuti pericolosi. Non disperdere di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli la etichetta). nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

CARATTERISTICHE

PYGANRC 1.4 è un insetticida a base di Protro naturale in supporto liquido di origine vegedale che può essere impiegate su na numero elecate di colture agrarie in qualsiasi stagione dell'anno.

iignole, Cavolaia, Tripidi, Tenucdini. Criocera dell'asparage **Clotolato**, el pomodoro, Borifora della patria e della melanzana, nonche contro gli insetti defogliane, della "Cegotoro e succhiatori. 1.4 è un metticida di contatto che agisce rapidamente contro i parassiti delle orticole, fraticole e floricole, quali per esempio Afidi, Alcurodidi (Mosea Bianea), Metenifa. Psille, Cocciniglie,

Rev. 0212

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Drupacee (susine, ciliegie, albicocche, pesche, prugne, nettarine) contro Afidi, Mosca mediterranea della frutta, Tignole, Tentredini, Tripidi: ml 150-250/hl d'acqua: Metcalfa: 250 ml/hl d'acqua:

Pomacee (mele, pere, cotogne) contro Afidi (all'inizio dell'infestazione) compreso Afide grigio del melo (in prefioritura), Tripidi, Antonomo, Psilla (prima della melata), Tentredini, Minatori (adulti) compreso Minatore delle foglie del melo, Tingide del pero, Mosca mediterranca della frutta, Ricamatori Cimice, Piralide: ml 150-250/hl d'acqua;

contro Metcalfa: 250 ml/hl d'acqua;

Agrumi (pompelmi, limoni, mandarini, arance) contro Afidi, Tripidi, Cimici, Mosca mediterranea della frutta, Tignole, Formica argentina, Aleurodidi (adulti): ml 150-250/hl d'acqua; contro Metcalfa: 250 ml/hl d'acqua;

Olivo contro Mosca dell'olivo, Tignola. Cocciniglie, Tripidi: ml 150-250/hl d'acqua; contro Metealfa: 250 ml/hl d'acqua;

Frutta a guscio (Mandorle e Nocciole) contro Pentatomidi (cimici verdi). Alfdi (all'inizio Vite contro Tignola dell'uva e della vite, Tripidi, Cicaline, Scafoideo della vite: ml 150-250/hl d'acqua dell'infestazione). Tingide del mandorlo: ml 150-250/hl d'acqua: contro Metcalfa: 250 ml.hl d'acqua: contro Metcalfa: 250 ml/hl d'acqua;

Fico contro Cicaline, Psilla. Cocciniglie, Tignole: ml 150-250/hl d'acqua; contro Metcalfa: 250 m/hl Melograno contro Afidi, Cocciniglie. Tignole: ml 150-250/hl d'acqua; Metcalfa: 250 ml.hl d'acqua: d'acqua;

ORTICOLE

Carciofo, Pisello, Fagiolo, Fagiolino, Lattuga, Fava, Cipolla, Carota, Bietola da costa e da orto. Cavolo, Spinacio, Finocchio, Sedano, Radicchio, Cicoria, Indivia, Prezzemolo, Rapa, Ravanello. Asparago contro Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Altica, Cimici, Cicaline, Criocera, Dorifora, Piralide,

Tipula, Tentredini, Mosca, Cavolaia, Tignole; ml 150-250/hl d'acqua;

Cavolo contro Cavolaia: ml 150-250/hl d'acqua;

Melanzana, Peperone, Patata, contro Dorifora: ml 150-250 ml /hl d'acqua: Pomodoro contro Moscerino bianco (adulti): ml 250/hl d'acqua:

Fabacco contro Aleurodidi (Mosca Bianca). Afidi: ml 150-250/hl d'acqua;

Aglio, Porro, Scalogno contro tripidi, mosca: ml 150-250/hl d'acqua;

Cucurbitacee (zucca, zucchino, melone, cocomero, cetriolo) contro Afidi. Tripidi: ml 150-250/hl d'acqua

- FRAGOLA contro Afidi, Tripidi, Cimici, Psille: ml 150-250-bl d'acqua.
- CEREALI contro Afidi. Cimice: nel 150-250/hl d'acqua
- BIETOLA DA ZUCCHERO contro Afidi: ml 150-250/hl d'acqua.
- FORAGGERE LEGUMINOSE centro Fitonomo, Cicaline: ml 150-250/hl d'acq

Etichetta autorizzata con deereto dirigenziale del



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

FLORICOLE IN PIENO CAMPO

Crisantemo, Garofano, Rosa contro Afidi. Alcurodidi. Tentredini. Tripidi. Minatori fogliari, Metcalfa Cicaline: ml 150-250/hl d'acqua.

Formiche, Tingidi. Colcotteri e Lepidotteri defogliatori: ml 150-250/hl d'acqua (nel caso di larve di FLOREALI E ORNAMENTALI contro Cicaline. Afidi, Aleurodidi. Tripidi, Psille, Metcalfa. Ifantria al di sopra di 2 cm: ml 250/hl d'acqua).

sufficienti ad assicurare una completa ed uniforme bagnatura della vegetazione, alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata. Utilizzare volumi d'acqua e pressioni adeguate per ottenere una buona copertura della coltura. Curare in modo particolare la pagina inferiore delle foguie nel caso di Aleurodidi (mosca bianca), Tripidi e Tingidi. i trattamenti vanno effettuati con qualsiasi apparecchio a medio-basso volume con quantità di acqua

AVVERTENZA: PYGANIC 1.4 è compatibile con fertilizzanti fogliari. Non è miscelabile con la poltiglia bordolese, polisolfuri ed altri prodotti alcalini. Per ogni eventuale miscela con altri formulati, è consigliabile effettuare test preliminari di compatibilità.

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

Il prodotto è tossico per i pesci, le api e gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 2 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente syuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non puo' essere riutilizzato.

Rev. 0212

- ETICHETTA RIDOTTA -

PYGANIC 1.4

INSETTICIDA LIQUIDO CONCENTRATO EMULSIONABILE A BASE DI PIRETRO NATURALE

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:

Piretrine pure

g 1,4 (= 12,91 g/t)

(purezza 480 g/kg)

Coformulanti e Solventi q.b. a



IRRITANTE



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli la etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pusice il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.

Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo) - Tel. 035 - 335313

Distribuito da: Zapi Industrie Chimiche S.p.A. - Z.I. Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD)

OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO

MGK - 4001 Peavey Road Chaska - MN 55318 USA Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI) IRCA Service S.p.A. - S.S Cremasca 591 n. 10 - Fornovo S. Giovanni (BG) Kollant S.r.I. - Via C. Colombo, 7/7a - Vigonovo (VE) Zapi Industrie Chimiche S.p.A. - Z.I. Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD)

Registrazione n. 12566 del 15.03.2005 del Ministero della Salute

Contenuto: 1 - 25 - 50 - 100 cc

Riferimento Partita n. _

INFORMAZIONI MEDICHE

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini,

Sintomi a carico del sistema nervoso centrale: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periteriore Terapia: sintomatica e di rianimazione - Consultare un Centro Antiveleni.

AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUSE ESSERE RUTILIZZATO

— 52 **–**

Rev. 0212

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale dei 14 MAR. 2012



Etichetta in formato ridotto per la taglia da 1 ml

PYGANIC 1.4

Insetticida liquido concentrato emulsionabile a base di Piretro naturale

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:

Piretrine pure

g 1,4 (= 12,91 g/l)

(purezza 480 g/kg)

Coformulanti e Solventi q.b. a g 100

Contenuto: 1 ml

Registrazione n. 12566 del 15.03.2005 del Ministero della Salute

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.

Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo) -Tel. 035 - 335313

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 MAR. 2012

12A03486



DECRETO 14 marzo 2012.

Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari dell'impresa Sepran s.a.s. a base di piretrine - estratto B.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE del 18 dicembre 2008 della Commissione relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva piretrine componente il prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto;

VISTA in particolare la nuova purezza minima della sostanza attiva in questione, fissata per l'estratto B in 480 g/kg di piretrine, indicata nell'allegato al sopra citato decreto 22 aprile 2009;

CONSIDERATO che l'impresa Sepran s.a.s., titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del citato decreto 22 aprile 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti provvedendo nel contempo all'adeguamento del prodotto stesso ai nuovi requisiti sopraindicati;

VISTO il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva componente in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato DL.vo 194/95 nei tempi e con le modalità definite dalla direttiva di iscrizione stessa:

CONSIDERATO che, di conseguenza, la ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto può essere concessa fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva piretrine fatta salva la presentazione ai sensi dell'art 3, comma 2 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del citato decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n 545/2011 della Commissione, nei tempi e secondo le modalità fissate dalla direttiva di iscrizione in allegato I della sostanza attiva componente e la conseguente valutazione da parte della Commissione alla luce dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del medesimo decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n 546/2011 della Commissione;

VISTA la nota con la quale l'impresa Sepran s.a.s. titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato in allegato al presente decreto, ha trasmesso le etichette adeguate al sopra citato decreto 22 aprile 2009 ottemperando a quanto richiesto dall'ufficio circa le indicazioni della sostanza attiva piretrine nelle etichette stesse, comunicando nel contempo la modifica di denominazione dell'officina di produzione Kollant Srl-Vigonovo (VE) già LIFA Srl;

RITENUTO pertanto di ri-registrare provvisoriamente il prodotto fitosanitario riportato in allegato al presente decreto fino al 31 agosto 2019 fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'articolo 3, commi 2 e 3 del citato decreto 22 aprile 2009, pena la revoca dell'autorizzazione;

VISTI i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

DECRETA

E' ri-registrato provvisoriamente fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva piretrine il prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa SEPRAN s.a.s. alle nuove condizioni fissate dal decreto 22 aprile 2009.

Sono altresì autorizzate le modifiche indicate nell'ultima colonna della tabella in allegato al presente decreto.

Sono fatti salvi:

gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'articolo 3, commi 2 e 3, del citato decreto 22 aprile 2009 di iscrizione della sostanza attiva piretrine, che fissa tempi e modalità di presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n 545/2011 della Commissione, ai fini della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n 546/2011 della Commissione;

E' approvata quale parte integrante del decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il direttore generale: Borrello



ALLEGATO

Prodotti fitosanitari dell'impresa SEPRAN s.a.s. a base della sostanza attiva **piretrine - estratto B** ri-registrati provvisoriamente fino al 31 agosto 2019 ai sensi del decreto ministeriale 22 aprile 2009 .di recepimento della direttiva 2008/127/CE del 18 dicembre 2008 della Commissione.

N. reg.ne	Nome prodotto	Data	Modifiche autorizzate
		reg.ne	
009404	TETRAPLUS COMBI EC	20/10/1997	Modifica della composizione in adeguamento a quanto stabilito dal DM 22/04/2009 relativamente alla purezza della sostanza attiva pietrine (estratto B di piretro 480 g/Kg); Modifica della denominazione dello stabilimento di produzione KOLLANT Srl,–Vigonovo (VE) già

ETICHETTA formato ridotto

TETRAPLUS COMBI EC

INSETTICIDA – AFICIDA A LARGO SPETTRO D'AZIONE (Liquido emulsionabile in microemulsione)

TETRAPLUS COMBIEC

Composizione: gr. 100 di prodotto contengono:

Piretrine pure (purezza 480 g/kg)

Piperonilbutossido puro

7,7 g (92,4 g/l)

Coformulanti

3 g (36,0 g/l)

7,7 g (92,4 g/l)

q.b. a 100 g

Frasi di rischio: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini – Non mangiare, né bere, ne fumare durante l'impiego – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non gettare i residui nelle fognature – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative In materia di sicurezza.

Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuiti pericolosi.



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SEPRAN s.a.s.

36033 ISOLA VICENTINA (VI) - Via Brenta, 20 - Tel. 0444/976562

OFFICINE DI PRODUZIONE: CHIMAC-AGRIPHAR s.a., Ougrée (Belgio) - DIACHEM S.p.A. – U.P. SIFA, Caravaggio (BG) - KOLLANTs.r.I., Vigonovo (VE) - I.M.C. limited, Naxxar (Malta) - I.R.C.A. Service s.r.I., Fornovo S.Giovanni (BG) - NUOVA AGRICHIMICA SARDA s.r.I., Oristano - TERRANALISI s.r.I., Cento (FE) - TORRE s.r.I., Torrenieri (SI) Distribuito da: NUOVA AGRICHIMICA SARDA s.r.I., Oristano.

Registrazione n. 9404 del 20.10.1997 del Ministero della Sanità

Contenute note: ml 40.45.20.25.20.2

Lotto n°.....del....

Contenuto netto: ml. 10,15,20,25,30,35,40,45,50,70,100

- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
- PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
- NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMÉNTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA
- SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
- IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
- NON OPERARE CONTRO VENTO
- IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (non pulire il materiale d'applicazikone in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolol delle acquje dalle aziende o dalle strade)
- DA NON VENDERSI SFUSO

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

ETICHETTA NORMALE E FOGLIO ILLUSTRATIVO

TETRAPLUS COMBI EC

INSETTICIDA - AFICIDA A LARGO SPETTRO D'AZIONE (Liquido emulsionabile in microemulsione)

TETRAPLUS COMBI EC

Composizione: gr. 100 di prodotto contengono:

Piretrine pure (purezza 480 g/kg) (36,0 g/l) 7,7 g Piperonilbutossido puro (92,4 g/l) Coformulanti q.b. a 100 g

Frasi di rischio: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare

a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini

Non mangiare né bere, ne fumare durante l'impiego – Conservare Iontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non gettare i residui nelle fognature – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative In materia di sicurezza. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SEPRAN s.a.s.

36033 ISOLA VICENTINA (VI) - Via Brenta, 20 - Tel. 0444/976562

OFFICINE DI PRODUZIONE: CHIMAC-AGRIPHAR s.a., Ougrée (Belgio) - DIACHEM S.p.A. – U.P. SIFA, Caravaggio (BG) - KOLLANT s.r.I., Vigonovo (VE) - I.M.C. limited, Naxxar (Malta) - I.R.C.A. Service s.r.I., Fornovo S.Giovanni (BG) - NUOVA AGRICHIMICA SARDA s.r.I., Oristano - TERRANALISI s.r.I., Cento (FE) - TORRE s.r.I., Torrenieri (SI) Distribuito da: NUOVA AGRICHIMICA SARDA s.r.I., Oristano.

Registrazione n. 9404 del 20.10.1997 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: ml. 10,15,20,25,30,35,40,45,50,70,100,150,200,250,300,400,500,750 - lt 1,5

Lotto nº.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto sotto chiave - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i Jocali dopo l'applicazione - Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il goccolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

INFORMAZIONIPER IL MEDICO

INFORMAZIONIPER IL MEDICO
Trattasi di associazione della seguenti sostanze attive: Piretrine 3% e Piperoniibutossido 7% le quali provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
Piretrine Sintomi: Doccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinaplicamente le terminazioni neuronali; Particolare sensibilità da parte di
pazienti allergici e asmatici, nonché del bambini. Sintomi a canco del SNC, tremon, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree, rinorrea, tosse,
broncospasmo e dispnear (eazioni allergiche scatenanti, anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rinormazione.

N.B.: Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: TETRAPLUS COMBI EC è un insetticida-aficida, ad ampio spettro d'azione, che agisce per contatto e ingestione contro tutti gli insetti dannosi delle piante. Si caratterizza per la rapida azione iniziale. Garantisce una protezione sufficientemente duratura ed ha una persistenza di azione di 3-5 giorni per la presenza nel formulato di sostanze antiossidanti del piretro. Può essere impiegato in qualsiasi stagione fino a 2 giorni prima del raccolto o l'immissione al consumo.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: TETRAPLUS COMBI EC deve essere impiegato alla dose di 100-120 ml per 100 litri d'acqua su: Melo: DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: TETRAPLUS COMBI EC deve essere impiegato alla dose di 100-120 ml per 100 litri d'acqua su: Melo: contro Afidi, Carpocapsa, Cacoecia, Pandemis, Rodilegno, Antonomo, Eulia, Oplocampa, Cocciniglie, Capua; Pero: contro Afidi, Carpocapsa, Pandemis, Tingide, Tripide, Rodilegno, Antonomo, Eulia, Oplocampa, Cocciniglie, Capua; Ciliegio: contro Capua, Rodilegno, Anarsia, Cacoecia, Cocciniglie, Afidi; Pesco: contro Anarsia, Cydia molesta, Cocciniglie, Afidi; Agrumi: contro Afidi; Vite: contro Tignole; Orticole varie (cavoli, cipolle, fagiolini, melanzane, piselli, pomodori, ecc.): contro Afidi, Dorifore, Nottue; Patate: contro Dorifore ed Afidi; Azalea, in pieno campo: contro Tripidi, Minatrici delle foglie, Aleurodidi, Nottue; Begonia, in pieno campo: contro Miniatrici delle Foglie, Aleurodidi; Garofano, in pieno campo: contro Afidi, Cocciniglie, Aleurodidi; Rosa, in pieno campo: contro Afidi, Cocciniglie, Aleurodidi; Minatrici dei getti, Tripidi. TETRAPLUS COMBI EC deve essere impiegato alla dose di litri 1,5 per ettaro su: Barbabietola da zucchero: contro Cleoni, Altiche, Cassida, Nottue, Afidi; Frumento e cereali minori: contro Afidi, Cecidonie, Tripidi, Criocere.

COMPATIBILITA': TETRAPLUS COMBI EC non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NON RIENTRARE NELLE ZONE TRATTATE PRIMA DI 48 ORE.

NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci e gli insetti utili.
L'INTERVALLO che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta per: melo, pero, ciliegio, pesco, agrumi, vite, orticole varie, patate, barbabietola da zucchero, frumento e cereali minori, è di 48 ore.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

- DA NON APPLICARE CON MEZZI AFREI
- PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
- NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
- IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE NON OPERARE CONTRO VENTO
- IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità 4 cque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende e dalle strade);

DA NON VENDERSI SFUSO

12A03487



Alfonso Andriani, redattore Delia Chiara, vice redattore

(WI-GU-2012-SON-052) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;
- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.


Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.





€ 4,00